

1. 黃家 平素患有黃疸而時時發作的病人。
2. 風黃 病名。黃病二十八候之一。
 - (1)《諸病源候論 黃病諸候》：“風黃候，凡人先患風濕，復遇冷氣相搏，則全身疼痛，發熱而體黃。”三十六黃之一。
 - (2)《聖濟總錄》卷六十一：“病人愛笑，腰背急，手足強，口乾，舌上生瘡，三部脈亂，此是風黃。”臨床治療多用烙法及服祛風藥。
 - (3)《雜病源流犀燭·諸疸源流》：“風黃，身不黃，獨目黃，其人肥，風不外泄故也。宜青龍散。”
3. 九疸 九種黃疸之合稱。
 - (1)《諸病源候論·黃病諸候》：“九疸候，夫九疸者，一曰胃疸，二曰心疸，三曰腎疸，四曰腸疸，五曰膏疸，六曰舌疸，七曰髓疸，八曰肉疸，九曰肝疸。”凡諸疸病，皆由飲食過度，醉酒勞傷，脾胃有虛熱所致。其病身面皆發黃，但立名不同。
 - (2)《外臺秘要》卷四列九疸為胃疸、心疸、腎疸、脾疸、肺疸、舌疸、肉疸、髓疸、肝疸。
4. 人黃 三十六黃之一，《聖濟總錄》卷六十一：“病人面青掩口，惡聞人聲，或似顛狂，此是人黃。”治宜灸烙法，內服赤箭散。
5. 三十六黃
 - (1)三十六種黃病證候。
 - (2)《太平聖惠方》卷五十五：“夫諸黃者，其黃皆因傷寒為本，五臟互有所傷，熱氣相侵，致使病人精神恍惚，六腑不和，七神無主，情意改變。”其所指與一些急性發熱病引起的發黃及意識障礙相似。三十六種黃為肝黃、心黃、脾黃、肺黃、腎黃、膽黃、腦黃、行黃、癰黃、胃黃、鬼黃、奸黃、走馬黃、立黃、黑黃、體黃、勞黃、脊禁黃、食黃、火黃、陰黃、氣黃、媼黃、髓黃、房黃、血黃、憂黃、驚黃、花黃、瘡黃、水黃、蛇黃、牛黃、鴉黃、雞黃、蚰蜒黃等。
 - (3)《聖濟總錄》卷六十一云黃病三十六種“皆非黃疸之比”。謂本病多發生在東南地帶，地氣濕熱，易成瘴毒，人感而成黃，其所指似包括我國南方一帶地區性傳染病。所載三十六黃為心黃、肝黃、脾黃、肺黃、腎黃、鬼黃、奸黃、血黃、人黃、髓黃、陰黃、急黃、氣黃、癰黃、白黃、明黃、膽黃、驚黃、風黃、走精黃、酒黃、雞黃、蚰蜒黃、火黃、走馬黃、房黃、黑黃、厭黃、水黃、爪黃、腸黃、犢黃、豬黃、土黃、蝦蟆黃。
6. 女勞疸 病名。五疸之一。
 - (1)語出《金匱要略·黃疸病脈証并治》。多因房勞醉飽傷腎，瘀血內阻，血蓄小腹所致。證見額上微黑，一身盡黃，微汗出，手足心熱而反覺惡寒，因作黑疸。薄暮即發、膀胱急、少腹滿、小便自利、大便溏黑。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。臨床所見本證多出現在黃疸病的後期，是氣血兩虛、濁邪瘀阻的證候。常伴有脅下積塊脹痛、膚色暗黃、額上色素沉著、舌質暗紅、脈弦細等，嚴重的發生臌脹。
 - (2)《症因脈治，黃疸論》：“女勞疸之症，發熱惡寒，膀胱急，小腹滿，身黃額黑，足心熱，大便或黑或溏，腹脹如水。”
 - (3)治以補腎消瘀為主，方用減黃丹、小菟絲子丸、硝石礬石散等。小腹連腰下痛者，宜大黃附子湯、去細辛加肉桂或用豬膏髮煎。神思

昏倦，頭目昏重，脾氣不運，大便不實者，宜四君子湯下硝石礬石丸。實者用石膏散；虛者用腎疸湯。小便不利者，用滑石散。房勞黃病，體重不眠，眼赤如硃，腹中塊起若瘕者，宜灸心俞、關元、二穴，各二七壯，兼烙舌下。並用婦人月經衣連血燒灰，空心酒服二錢，日二服，三日即效。

7. 小兒身熱痿黃 病證名。指小兒夏令發熱，**筋骨痿弱，身目發黃**。

《衛生寶鑑》：“小兒身體蒸熱，胸膈煩滿，皮膚如潰橘之黃，眼中白睛亦黃，筋骨痿弱不能行立。此由夏季之熱加以濕蒸搏於經絡，入於骨髓，使臟氣不平，故脾逆乘心，濕熱相合而成此疾也。”心火實則身體蒸熱，胸膈煩悶；脾濕勝則發黃；肝腎受邪，則筋骨痿弱。由濕熱鬱蒸肌膚筋骨所致。治宜清熱利濕，舒筋活絡，而治痿獨取陽明，故治宜清瀉陽明為法，用瀉黃散加茵陳蒿，苡米、木瓜之類。

8. 小兒疸

病兒因**脾臟虛弱，運化失職**，溼熱留於肌膚，發為黃疸所致。多見身痛背強，二便澀滯，遍身面目爪甲皆黃，若小便褐澀者難治，尿道通利者易治。（一說小便利者易治，澀者難治。）

(1)治法如下：陽黃宜茵陳湯、犀角飲、連翹赤小豆湯、加減瀉黃散、張渙蘆根湯、子芩散、三黃散、雙連丹之屬；陰黃宜當歸丸、小半夏湯之屬。滲溼宜茯苓滲溼湯之屬。消食宜消食丸之屬。或用三稜、蓬莪朮、青皮、陳皮、神麴、麥芽、黃連、甘草、白朮、茯苓各等分為末，溫水調服。

(2)加減：吐瀉，加山楂。

時氣吐瀉，加滑石。

發熱，加薄荷。

和胃，宜平胃散、調中丸之屬。

搐鼻，宜瓜蒂散之屬。

乾黃小便利，四肢不沈重，口渴引飲者，宜梔子柏皮湯。

溼黃小便不利，四肢沈重，渴不欲飲者，宜大茵陳湯。

大便自利而黃者，宜茵陳梔子黃連三物湯。

往來寒熱，一身盡者，宜小柴胡加梔子湯。

腹大食土者為脾疳，若兼口渴引飲者，宜瀉黃散。

病後發黃肢體浮腫者，宜白朮散。

清便自調，肢冷嗜臥者，宜益黃散。

身澹黃白色者，宜調中丸及補中氣湯加茵陳。

身熱膈滿，肌膚面目皆黃者，宜加減瀉黃散。

閉目壯熱啼哭不已，小便赤澀，口中氣熱者，此妊娠厚味，胎毒蘊積，宜母子並服生地黃湯。

忌酒麵五辛熱物，黑疸諸藥不效者，宜千金赤苓散或用土瓜根搗汁五合，分服之。

黃黑諸疸藥不效者，用當歸三兩、桂心六兩、乾棗十七枚（去核）、麥冬一升、茵陳、黃芩、黃耆、乾薑、茯苓、芍藥、黃連、石膏（研）、人參、甘草各二兩，水一斗，煮取三升半，分四服，兒小酌減。

9. 小兒黃病 病名。

(1)《太平聖惠方》：“夫小兒黃病者，是熱入於脾胃，熱氣蘊結，與穀氣

相搏，蒸發於外，故皮膚悉黃，眼赤黃也，脾與胃合，俱象於土，候於肌肉，其色黃，故脾胃內熱，即蒸發於外，令肌膚黃也。

(2)"《幼幼集成》謂小兒黃病，濕熱發黃者少，脾虛發黃者多。蓋脾土強者，足以捍御濕熱，必不生黃，惟其脾虛不運，所以濕熱乘之，治宜茵陳五苓散，去其濕熱，黃稍退，即速健脾，若面目俱黃而帶虛浮，唇白舌淡，口不渴，身不熱，夜無煩熱，小便不澀，不可認為濕熱而分利之，速救脾胃，宜用四君子湯加減為治。

10. 小兒黃疸 病兒脾弱失運，濕熱留於肌膚，發為黃疸。兒疸周身及面目爪甲皆黃，多見身痛背強，二便澀滯，若小便褐澀者難治，尿道通利者易治。
11. 小兒瘀熱發黃 病證名。小兒瘀熱在裏而發生的黃疸。
《聖濟總錄》第一百七十四："小兒瘀熱在胃，或濕熱相搏，熏在肌肉，其證目黃，身或疼痛，肌肉如橘色。或得之傷寒，或得之邪氣，或得之風溫，皆脾胃氣虛，邪熱與穀氣相搏所為也。"治宜清熱利濕，涼血解毒，用《證治準繩》地黃湯：茵陳、生地、川芎、赤芍、當歸、花粉、茯苓、澤瀉、甘草加減。
12. 五色黃 黃病二十八候之一。由脾熱引起身黃。見《諸病源候論·黃病諸候》。若脾更移熱於它臟，則於身面、眼目、舌下並可出現該臟之色。如脾移熱於肝則可見眼青黃，面色青，脈亦青；如脾移熱於心，則其人身熱而發赤黃，眼赤高視，心腹脹滿，脈亦赤；如脾移熱於肺，其人身熱發黃白，舌下生白垢；如脾移熱於腎，則其人身熱發黑黃，唇黑眼黃，舌下脈黑等。
13. 五疸 五種黃疸的合稱。
(1)《金匱要略·黃疸病脈証并治》指黃疸、穀疸、酒疸、女勞疸、黑疸五種。
(2)《備急千金要方》卷十指黃疸、穀疸、酒疸、女勞疸、黃汗五種。
(3)《肘後備急方》卷四："疸病有五種，謂黃疸、穀疸、酒疸、女疸、勞疸也。"
(4)指五種黃疸的病因。《本草綱目》卷三："黃疸有五，皆屬熱濕。有瘀熱、脾虛、食積、瘀血、陰黃。"
14. 內黃 黃病二十八候之一。《諸病源候論·黃病諸候》："熱毒氣在脾胃，與穀氣相搏，熱蒸在內，不得宣散，先心腹脹滿氣急，然後身面悉黃，名為內黃。"治宜選用梔子散、茵陳散、三黃散等方。
15. 內傷黃疸 病證名。指因脾胃內傷所致的黃疸。
(1)《症因脈治》卷三。包括穀疸、酒疸、女勞疸、陰黃在內。
(2)《醫學綱目》卷二十一："勞役形體，飲食失節，中州變寒，病生黃，非外感而得，只用建中、理中、大建中足矣。"
(3)《石室秘錄·黃疸》。"黃疸，蓋外感之濕易治，內傷之濕難醫，外感單治濕而疸隨愈，內傷單治濕而疸難痊，瀉水則氣愈消，發汗則精愈泄，"治宜健脾、化濕、溫腎、利膽為主。忌用攻法。"
16. 心疸 病名。因心中虛熱所致皮膚盡黃而面目獨白，煩渴引飲，水停心下時作水聲，胸前汗出的病症。此證多見心煩心熱之象。
(1)九疸之一。《外台秘要》卷四："心瘰，煩心，心中熱，葛根主之。"
(2)《辨證奇聞》："心疸之症，煩渴引飲，一飲水即停于心之下。時作

水聲，胸前時多汗出，皮膚盡黃惟兩目獨白、人以爲黃疸也，誰知是心中虛熱以成之乎。”治宜“補肝氣以生心，瀉其火濕以逐熱。”方用瀉肝利濕湯。治宜黃連、茜根之屬。

17. 心黃

三十六黃之一。

(1)《太平聖惠方》卷五十五：“心黃者，目赤，舌上生瘡，心悶喘急，多言無度，或笑或嘔，微微汗出，口乾舌短，起臥不安，神思恍惚，小便赤難，心下脹滿，狀如風火，悲哭，手亂捻物者難治。”治法用生地黃飲子、馬牙消散等方。

(2)《聖濟總錄》卷六十一：“病人面赤，口張，氣喘，多驚，饒睡，手腳煩疼，舌上瘡生，心下急悶，不欲飲食，舌縮口乾，七八日內必發狂走，即是心黃。”治用柴胡湯並加灸法。

18. 水黃

病名。三十六黃之一。《太平聖惠方》卷五十五：“水黃者，身面青黃，腳膝浮腫，心腹脹滿，上氣煩悶，語聲不出。”治用大黃甘草湯等方。

19. 火黃

三十六黃之一。病人遍身如火色。

(1)《太平聖惠方》卷五十五：“火黃者，遍身如火色，兩腋下赤點子，狀如粟米或如麥麩。其點子紫色多，黑色少者可治；黑色多，紫色少者難治。

(2)《聖濟總錄》卷六十一：“病人先體熱身赤，午後卻涼，遍身有赤點起，宜烙腳心、背心、手心、百會、下廉即差。如生黑點，不可療也，如無黑點，宜服紫草湯。

20. 爪黃

三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一：“爪黃之病，口苦舌乾，身體急強，面目俱黃，行履不得，言語狂亂，四肢疼痛，發即便走。”治用灸烙法，內服瓜蒂散等方。

21. 外感黃疸

病症名。

(1)《症因脈治》卷三。指因外邪失治傳裏，化熱熏蒸所致的黃疸。

(2)《素問·玉機真藏論》：“今風寒客於人，使人毫毛華直，皮膚閉而爲熱，當是之時，可汗而發也。……弗治，肝傳之脾，病名曰脾風，發瘧，腹中熱，煩心出黃。”傷寒陽明病可見本證。

(3)《傷寒論·辨陽明病脈證並治》：“傷寒七八日，身黃如橘子色，小便不利，腹微滿者，茵陳蒿湯主之。傷寒身黃發熱者，梔子柏皮湯主之。傷寒瘀熱在裏，身必發黃，麻黃連翹赤小豆湯主之。

(4)《諸病源候論》有風黃候、傷寒變成黃候、時氣變成黃候、溫病變成黃候等。按其病因，均屬外感黃疸的範疇、亦指臟腑素有積熱，復受外邪誘發所致的黃疸。治療當以去邪、清熱、利濕爲主。

22. 正黃疸

病名。一般常見之黃疸病。內因脾胃積熱，外因風濕相搏，閉鬱於腠理，濕熱熏蒸而成

《症因脈治》卷三：“正黃疸之症：食已即飢，遍身俱黃，小便或赤或不利，憎寒壯熱，身體如腫。”多由臟腑積熱，並於脾胃之間，外因風濕相搏，閉鬱腠理，溼熱熏蒸，壅而成黃。如見表證脈浮，可汗解，用桂枝黃耆湯。若寒熱，胸滿，煩嘔，用小柴胡湯。惡寒身痛，表不解者，用麻黃醇酒湯。若腹滿小便不利而赤，自汗出，爲表解而裏有實熱，宜下，用大黃硝石湯、茵陳湯。小便不利，用加減五苓散。胸滿嘔吐，用小半夏湯。黃結上焦者，用瓜蒂散吐之。外治可用吹鼻法，出其黃水。

23. 犯黃

證名。黃疸已退因觸犯禁忌復發者。黃疸二十八候之一。《諸病源候論·

黃病諸候》：“有得黃病已瘥，而將息失宜，飲食過度，犯觸禁忌，致病發胃，名為犯黃候。”犯黃即指黃疸已退而又發者，多屬慢性肝臟疾患。

24. 白黃

目內白睛(鞏膜)作黃色也。

25. 目黃

(1)《金匱藏府經絡先後病脈証篇》目色黃者便難。按此證因風氣與陽明入胃，循脈而上至目內眦，其人肥，風氣不得外泄，則為熱中而目黃，煩渴引飲，然其黃止於兩目，非若黃疸兼及於全身，宜越婢加朮湯、桂枝二越婢一湯、青龍飲、之屬。病久體虛者，理苓湯倍用苓桂。若因黃疸病而目黃不除或頭重者，宜用瓜蒂散搐鼻，俟黃水流出後，以茵陳五苓散清利之。

(2)《羅氏會約醫鏡·雜證》謂“然目黃亦有虛實之異。實熱之黃，以濕熱內蓄，鬱蒸而成，清其熱而黃自退；若虛寒之黃，以元陽日剝，津液消索而然，無煩熱脈症，惟有乾涸枯黃，此則其衰已甚，須大加溫補，始可救治。”

(3)《醫學綱目·目黃》“經云：目黃者曰黃疸，然亦有目黃而身不黃者，風氣自陽明入胃，循脈而上至目眦，其人肥，風氣不得外泄，則為熱中而目黃。”治宜選用青龍散等方。

26. 奸黃

病名。三十六黃之一。

(1)《太平聖惠方》卷五十五：“奸黃者，是鬼黃變入奸黃也。面目遍身俱黃，言語失錯，心神狂亂，詐奸黠如不患人，若不與漱，即口舌乾燥，氣喘者難治。”治用犀角散。

(2)《聖濟總錄》卷六十一，“病人向明臥多，愛索鞋擬起，身體全冷，肉色蒼黑，睡中啼泣，或狂言妄語。此是奸黃。”治用茯神湯。

27. 肉疸

病名。

(1)《諸病源候論·黃病諸候》。為九疸之一，症見身面發黃，飲少，小便多而色白如泔之証。

(2)《三因極一病証方論》卷十：“發于脾，則為肉疸。”多因飲食過度，醉酒勞傷，脾胃有瘀熱所致。治宜清利濕熱，寒水石散等方。

28. 舌疸

病名。見《諸病源候論·黃病諸候》。為九疸之一。因飲食過度，醉酒勞傷，脾胃有瘀熱所致。症見身面發黃，口渴便數。治宜清心降火。

29. 色疸

女勞疸之別稱。

30. 血疸

病証名。出《奇效良方》。指嬰兒血分熱毒而引起的黃腫。小兒胎熱者，初生下肌膚紅白，二月以後，遍身黃腫，眼閉不開，作呻吟聲。此因胎內有熱或因妊母服熱藥，熱毒遺于胎兒所致。治宜內服清熱解毒之劑，外用黃柏煎水浴之。

31. 血黃

病證名。三十六黃之一。

(1)《太平聖惠方》卷五十五：“血黃者，頭痛心悶，眼運欲倒，胸膈熱壅，鼻衄不止，咽喉乾燥，舌上生瘡。若身熱如火，頭面腫者，難治。”

(2)《聖濟總錄》卷六十一，“病人三日鼻中出血，大小便亦下血，心間煩悶，腹中有塊，痛如蟲咬，吐逆喘粗，此是血黃。”治用點烙法或服續隨湯。

32. 行黃

證名。黃病二十八候之一，黃疸而不影響行立者。

- (1)《諸病源候論·黃病諸候》:"瘵熱在脾藏，但肉微黃，而身不甚熱，其人頭痛心煩，不廢行立，名為行黃。"
- (2)《太平聖惠方》卷五十五治行黃方，用黃芩、麥門冬、犀角屑、栝藹根、梔子仁、甘草等藥。
33. 肝疸
病名。九疸之一。
(1)《諸病源候論·黃病諸候》。由飲食過度，醉酒勞傷，脾胃有瘵熱所致。症見身面發黃，胃熱飲水多，治宜秦王散等方。或宜白朮之屬。(2)《辨証奇聞》載述肝疸由**肝氣鬱結，濕熱不散**引起。症見全身盡黃，而以兩目為甚，氣逆，手足發冷，腰以上汗出不止。治法以疏肝解鬱、分利濕熱為主，方用利肝分水散。
34. 肝黃
病名。三十六黃之一。
(1)《太平聖惠方》卷五十五:"肝黃者，面色青，四肢拘急，口舌乾燥，言語蹇澀，面目不利，爪甲青色，若背上浮腫，腹脅脹滿者難治。"治用烙法及柴胡散、犀角散等方。
(2)《聖濟總錄》卷六十一:"病人齒黃，目如丹赤，口燥熱渴，氣力虛劣，**身體青黃**，即是肝黃。"治用灸烙法或土漿方及知母湯等。
35. 肝鬱黃疸
病證名。見《診餘集·黃疸》。其症"**忽然嘔吐，發熱，遍體疼痛**，熱退則面目俱黃，此宜從疏肝理氣，利濕健脾自愈，又不可用溫熱也。"
36. 走馬黃
三十六黃之一。《太平聖惠方》卷五十五："走馬黃者，眼目黃赤，煩亂狂言，**走臥不安，氣力強壯，唯愛嗔怒，怒目高聲，打罵他人，猶如癡醉**。若厥逆者難治。"治用點烙法，內服竹葉湯等方。
37. 走精黃
病證名。三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一:"走精黃，病人**昏昏欲睡**，四肢疼痛，面目俱黃，舌上紫色，甚則舌面坼裂，及加黑色，此是走精黃，宜用藥烙之。"
38. 房黃
病名。三十六黃之一。
(1)《太平聖惠方》卷五十五:"房黃者，眼赤身黃，骨髓煩疼，頭目昏痛，多饒睡臥，體虛無力，夜多夢泄，神思不安，腰腳酸疼，小便黃赤。
(2)《聖濟總錄》卷六十一:"病人身體沉重，狀似著熱，不得睡臥，小便黃色，眼赤如朱，心下塊起，狀如癡人。"治用點烙法，內服鹿茸散等方。
39. 肺疸
病名。
(1)九疸之一。《外合秘要》卷四："肺疸，飲少，小便多。"一名膏疸。
(2)《辨証奇聞》:肺疸為肺氣虛而失清肅之職，**不能通調水道**，以致濕熱逗留而發黃者。証見鼻塞不通，頭面俱黃，口淡咽乾，小便不利。治宜宣通肺氣，健脾利水。方用揚肺利濕湯。
40. 肺黃
病名。三十六種黃之一。
(1)《太平聖惠方》卷五十五:"肺黃者，眼目白色，頭面微腫，鼻衄不止，多涕憎寒，遍身生赤粟子，壯熱，腹脹胸滿，上氣。若粟子紫黑色及腫者，難治。"治宜用栝藹散方，及瓜蒂末搐鼻出黃水等法。
(2)《聖濟總錄》卷六十一："肺黃，口乾舌縮，目赤鼻血出，……煩渴欲得飲水，及大便不利。"治療可用灸法或消消湯。
41. 表邪發黃
即傷寒發黃。
42. 金勞黃
古病名。見《儒門事親》卷六。即脾疸。
43. 急黃
病名。

(1)《諸病源候論·黃病諸候》，卒然發黃也。黃疸病病勢急驟險惡者。因濕熱毒邪燔灼營血所致的黃疸，它的特點是發黃急驟，卒然面目全身發黃，或初不發黃，死後身面發黃者，伴有高熱煩渴，溲赤，胸滿腹脹，甚則神昏譫語，衄血，便血，或發斑等，脈多弦滑數，舌紅絳，苔黃膩或燥。有初得病身體面目即發黃者，亦有初不知黃死後纔變黃者。本病是因脾胃素有積熱，穀氣鬱蒸而復為客氣熱毒所加，燔灼營血所致。濕熱之毒熾盛，灼傷津液，內陷營血，邪入心包所致。是陽黃的重證。急黃與後世所稱之瘟黃相似，治以清熱解毒、涼血開竅為主。

(2)方如《千金要方》犀角散、黃連解毒湯、梔子丸、神犀丹、安宮牛黃丸等。並宜中西結合搶救治療。與後世瘟黃相似，參瘟黃條。本病可見於急性、亞急性肝壞死，化膿性膽管炎及鉤端螺旋體病之黃疸出血型等。

44. 疫病發黃 天行時疫而發黃也，此證脈數發熱，口渴引飲，便秘溲赤。由邪熱在陽明所致。凡時行感冒，伏暑未解，皆能患之。惟由疫而發者，殺人最速，宜解疫毒而救脾胃，用生首烏、黑豆、扁豆、甘草、鮮黃土、石斛、麥冬、赤苓、車前、神麴、穀芽、陳皮、之屬。餘如茵陳瀉黃湯、濟生茵陳湯之屬，亦可酌用。若其人脾胃素虛，脈細無力，體倦少神，冷汗自出，大便不實者，宜急救脾腎，俾不至內傳厥少，而有虛脫之險。

45. 胃疸 病名。

(1)見《素問·平人氣象論》。指多食多飲之証，已食如饑者胃疸。《外臺秘要》卷四：“胃疸，食多喜飲，梔子仁主之。”

(2)九疸之一，見《諸病源候論·黃病諸候》。病由飲食過度，醉酒勞傷，脾胃有瘀熱所致。其症以身面皆發黃，食多喜飲為特徵。此證因胃熱消穀。食多喜飲。面目黃瘦。胸滿脅脹。小便秘赤。宜梔子仁。或補中益氣湯加豬汁、炒川連酒黃蘗、澤瀉。

(3)即穀疸。《雜病源流犀燭·諸疸源流》：“如食已頭眩，寒熱，心中佛鬱不安，久則身黃，穀疸也，因飢飽所致，亦名胃疸，以胃氣蒸衝得之。”

46. 胃黃 病名。三十六黃之一。《太平聖惠方》卷五十五：“胃黃者，吐逆下利，心腹氣脹，或時煩悶，不能飲食，四肢無力，若唇口面目舌根黑者，難治。”治用點烙法及服人參散等方。

47. 胃熱胎疸 病証名。出《小兒藥証直訣》。指小兒生下百日或半歲內出現黃疸。症見身黃壯熱，腹脹口渴，大便秘小便赤澀。由陽明胃熱·濕邪留滯，濕熱郁蒸而發。治宜清利濕熱，用茵陳蒿湯合五苓散。熱重，用黃連解毒湯加減。

48. 胎疸 病証名。指新生兒出現的黃疸。又名胎黃。

(1)《諸病源候論》卷四十六：“小兒在胎，其母氣有熱，薰蒸于胎至生下小兒，體皆黃，謂之胎疸也。”

(2)《幼科鐵鏡》：“胎黃，由妊母感受濕熱，傳于胞胎，故兒新生，面目通身皆黃如金色，壯熱便秘，溺赤。”治宜清熱化濕，用茵陳蒿湯加味。若小兒先天元氣不足，脾氣血弱，寒濕不化，面色黯黃無澤，肢冷，便溏，治宜溫脾化濕，用理中湯加茵陳蒿。

49. 胎黃 病證名。初生胎兒黃疸。

(1)《幼科全書》。即胎疸。初生兒於出生後數天面目、皮膚發生黃疸，

叫"胎黃"，或稱"胎疸"，即現在所稱的新生兒黃疸。

(2)《幼科鐵鏡》："胎黃，由妊母感受濕熱，傳於胞胎，故兒新生，面目通身皆黃如金色，壯熱便秘，溺赤。"即胎疸。宜母子並服地黃湯及地黃飲子、犀角散、之屬。或用生地花粉、茵陳各一錢，煎服。若色淡黃兼白者，此胃怯也，宜白朮散。若生下百日後，不因病而身微黃者，此胃熱也，宜清之。輕症一般不用治療，黃疸可自行消退。

50. 胎瘰

即胎黃。

51. 胞疸

証名。黃疸二十八候之一。其証大小便皆色黃如黃柏汁。《諸病源候論·黃病諸候》："胞疸之病，小腸有熱，流于胞，內故大小便皆如藥汁，此為胞疸。"

52. 風疸

古病名，黃病之一。

(1)《備急千金要方》卷十："風疸，小便或黃或白，洒洒寒熱，好臥不欲動。"

(2)《太平聖惠方》卷五十五："夫風疸者，由風氣在于腑臟，與熱氣相搏，便發于黃，小便或赤或黃，好臥而心振，面虛黑。"如兼見身體皆黃，小便赤澀，宜服牛黃散方;如臟腑風熱相搏，心神不安，多臥少起，小便赤澀，犀角散方。

53. 風黃疸

古病名。《諸病源候論·黃病諸候》："夫風濕在於府藏，與熱氣相搏，便發於黃，即小便或赤或白，好臥而心振，面虛黑，名為風黃疸。"

54. 風瘰

瘰病之屬風者。《史記扁鵲倉公列傳》風瘰客臍。

55. 氣黃

病名。三十六黃之一。

(1)《太平聖惠方》卷五十五："氣黃者，上氣心悶，腹脅脹痛，兩腳冷疼，睡臥不安，小便淋澀，狀似脾黃。"

(2)《聖濟總錄》卷六十一："氣黃，病人初得，先從兩腳黃腫，大小便難，心中戰悸，面目虛黃，不能食。"治用灸烙法，內服葫蘆飲方。

56. 病後黃

此證有由失血後而黃者。蓋人身以血為榮，血旺則面色紅潤，血去則面色黃枯也。有因瘧後發黃者，此脾病色見於面也，治宜理脾異功散，加黃耆、扁豆(諸病後黃皆宜用之)。若胃脘久痛而變黃者，乃脾胃大虧，或挾瘀血痰飲所致，虛熱者宜脾陰@……。(觀)

57. 疳黃

病證名。指小兒疳疾兼有發黃。症見身黃浮腫，狀似黃疸，但目不黃，伴有疲倦少神，時吐黃水，毛發皆直，嗜異等。由於疳疾而致中焦濕熱鬱蒸，脾失運化而成。亦有疳疾日久而致血虛黃腫者。治宜健脾除疳，先服茵陳五苓散，繼用香砂六君子湯，以理虛和胃。

58. 疸

與瘰同。溼熱之偏體發黃或發黑者。通治諸疸。宜用當歸、三兩。桂心、六兩乾棗、十七枚(去核)。麥門冬、一升。大黃、一兩。茵陳、黃芩、黃耆、乾薑、茯苓、芍藥、黃連、石膏、人參、甘草各二兩(一方無黃耆)@父咀以清水一斗。煮取三升。分溫四。小兒量減服。

59. 疸黃

病名。中醫名為黃疸。

(1)三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一："病人體上黃綠色，胸中氣滿，或硬，不下飲食，此是疸黃。"治宜用灸絡法或用黃芩湯。

(2)驚恐膽虛而致的黃疸。《太平聖惠方》卷五十五："膽黃者，面色青黃，多驚少臥，悲泣不定，嗔怒無恒，舌上生瘡，唇口乾燥，若喘粗不止者，難治。"《景岳全書·雜證論》："膽黃證，凡大驚大恐及鬥毆傷者皆有之。""其證則無火無濕，其人則昏沉困倦，其色則正黃如

染。凡此數證，皆因傷膽，蓋膽傷則膽氣敗而膽液泄，故爲此證。"選用甘溫、酸澀、重鎮等藥，亦可用車前子等方。

60. 茶黃 病證名。指小兒遍身黃腫而嗜茶葉等異物的病證。《幼科鐵鏡》:"茶黃者，小兒胃腑積有濕熱，嗜食茶葉，或嗜生米、瓦礫黃土所致，遍身皆黃而腫。"治宜清胃化濕，用平胃散加茵陳蒿、梔子。一說用青礬炒黃豆，隨意食之有效。
61. 酒疸 病名。五疸之一，亦稱酒黃疸。
(1)語出《金匱要略·黃疸病脈証并治》心中懊懣而熱。不能食。時欲吐。名曰酒疸。(又)酒黃疸者，或無熱譫言，小腹滿欲吐，鼻燥，其脈浮者先吐之，沈弦者先下之。(又)夫病酒黃疸。必小便不利。其心中熱。足下熱。是其證也。(又)酒疸，心中熱欲吐者吐之愈。(又)酒黃疸，心中懊懣或熱痛，梔子大黃湯主之。(又)酒疸下之，久久爲黑疸，目青面黑，心中如噉蒜@薺狀，大便正黑，皮膚抓之不仁，其脈浮弱，雖黑微黃，故知之。按此證因飲酒過度，以致脾胃受傷，運化失常，濕濁內鬱生熱，濕熱交蒸，膽熱液泄所致。
(2)《寓意草·論錢小魯嗜酒積熱之証》謂飲酒過度，熱淫內熾，"故膽之熱汁，滿而溢出于外，以漸滲于經絡，則身目俱黃，爲酒疸之病。"証見身目俱黃，面發赤斑心中懊懣熱痛，鼻燥，腹滿不欲食，時時欲吐，小便赤澀等。治宜清利濕熱，解酒毒。若脈浮滑，欲吐甚者，當先探吐。脈沉滑而腹滿大便秘者，當先下之。實者宜梔子大黃湯。虛者宜花解酩湯加茵陳蒿。心滿不食或心中懊懣，小便黃赤者，宜當歸白朮湯或茵陳蒿湯。變成腹脹，漸至身面足俱腫者，急須培土，宜藿香扶脾丸。酒疸下之，久久爲黑疸者，宜梔子大黃湯去大黃，合犀角地黃湯、不應去地黃、加桂心、桃仁、穿山甲。餘如加味柴胡湯、藿杷飲、小麥飲、大黃湯、葛根湯、梔子仁煎湯調五苓散或生料五苓散加乾葛一錢，均可酌用。本病見于酒精性肝炎、酒精性肝硬化、膽汁鬱積性肝炎等。
62. 酒黃 病名。三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一:"病人五臟積熱，面赤，言語帶邪，昏沉錯亂，目中黃色，此是酒黃。灸後心、百會、下廉三處百壯。若憊氣上喘，脈如屋漏，此候不治，如只大便下血，宜服澤瀉湯方。"
63. 酒黃疸 即酒疸。
64. 鬼黃 病名。三十六黃之一。黃疸而見精神恍惚，言語錯亂者。
(1)《太平聖惠方》卷五十五:"鬼黃者，面色或青或黑，遍身皆黃，狂語多驚，皮膚枯，舌根謇澀，心中恍惚，常見鬼神，或自強言，詐作惺惺。若鼻中灰色，舌黑，毀裂衣裳者，難治。"治用丹砂散。-黃疸兼有妄見鬼物(幻視)者。
(2)《聖濟總錄》卷六十一："病人汗不出，漸加困重，憊氣心脹，唇黑遍身黃，妄見鬼物，道得古人名字，此是鬼黃。"治用龍齒湯。見於慢性或嚴重肝病所致的肝性腦病。
65. 梔黃痧 此證身面眼珠俱黃、四肢僵直、目直視、六脈似有似無、大小便閉、奄奄欲死。宜以蟾酥丸、玉酥丹之屬開竅。兼刺手足十指尖及曲池、肩井、陽交、委中、四穴。並用茵陳、瓜蒌仁、黑山梔、陳皮、桃仁、連翹、金銀花、枳實、黃芩、赤芍、大黃、之屬，水煎服。

66. 產後疸症 病名。見高淑濂《胎產方案》。多因產婦平素體熱，產後氣血更虛，風寒濕邪乘虛而入膽，鬱而發熱，溼熱薰蒸，膽汁泛溢肌膚，症見皮膚色黃，四肢倦怠，食少經閉，發熱，脈弦者，甚則目黃，尿黃如茶汁者，治宜加減陰疸湯(人參、柴胡、白芍、甘草、乾薑、半夏、黨參)，兼陽虧者加桂附;兼陰虛者加當歸、熟地;微熱者加丹皮。或用白朮(一兩)、人參、秦艽、牡丹皮、生地黃、木通、柴胡、芍藥(各五錢)、川芎、黃芩、乾葛(各一錢)、甘草(五分)，分爲十二劑，水煎，食前熱服。古人認爲產後疸證不宜用茵陳等清熱利膽藥，因茵陳清熱利熱，主治濕熱黃疸，其病因、病理與產後疸症不同。
67. 陰黃 黃疸兩大類型之一。
 (1)《景岳全書·雜證論》：“凡病黃疸而絕無陽證陽脈者，便是陰黃。”
 《諸病源候論·黃病諸候》：“陽氣伏，陰氣盛，熱毒加之，故但身面色黃，頭痛而不發熱，名爲陰黃。”
 (2)《聖濟總錄》卷六十一：“病人寒熱，並十指疼痛，鼻中煤生，此是陰黃。”治療宜“先烙上脘穴，更灸二十壯，次烙氣海、下廉、內乳等穴。不差，灸氣海、天窗、百壯。更宜服麻黃梔子湯。”若見人中反者，病情較爲嚴重。陰黃爲黃疸病之濕多熱少者，身目悉黃，色如煙熏，多因脾陽不振，寒濕內蘊或過服寒涼所致；亦可因陽黃日久轉化而致，以白睛(鞏膜)及皮膚黃色澤晦暗不鮮明爲特徵，並見神疲乏力、脅肋隱痛、腹脹、胃納差、渴不欲飲、小便清、大便溏薄，舌質淡、苔白滑，脈沉細遲等。治宜調理脾胃、溫化寒濕，方如茵陳五苓散、茵陳朮附湯、茵陳四逆湯等。多見於慢性肝炎、肝硬化、慢性膽囊炎、膽結石、肝硬化等病。
68. 陰疸 病名。又名陰瘧。黃疸之屬陰寒者。其証一身面目色黃晦暗，無熱惡寒，小便自利。
 (1)《醫鈔類編》卷九：“陰疸，無熱惡寒，小便自利，脈遲而微。誤開鬼門則肌膚冷硬，自汗不止，誤潔淨府則膀胱不約，小便如奔。”
 (2)《醫門法律·黃瘧門》“陰瘧病，誤從陽治，襲用苦寒、倒行逆施，以致極重不返者，醫殺之也…。其始必先退陰復陽，陰退乃從陽治。”治宜溫陽散寒，用茵陳附子乾薑湯等方。
 (3)高淑濂《胎產方案》：“產後黃疸名曰陰疸。”。
69. 陰瘧 即陰疸。見《醫門法律·黃瘧門》。
70. 蚰蜒黃 病名。三十六黃之一。
 (1)《太平聖惠方》卷五十五：“蚰蜒黃者，喉中似噎，喘息不調，四肢疼悶，言語不正，水米難下，若頰內有青脈出口角，手足亂動，冷者難治。”
 (2)《聖濟總錄》卷六十一：“病人身體涼冷，舌上黑脈，及兩頰有青脈起，目黃時時變異，腦如針刺，頭旋欲倒者，是蚰蜒黃。”治用治用點烙法，或內服半夏散等方。
71. 勞黃 病證名。
 (1)黃病二十八候之一。《諸病源候論》卷十二：“脾臟中風，風與瘀熱相搏，故令身體發黃，額上黑，微汗出，手足中熱，薄暮發，膀胱急，四肢煩，小便自利，名爲勞黃。”
 (2)三十六黃之一。《太平聖惠方》卷五十五：“勞黃者，四肢無力，骨節

- 煩疼，或時吐逆，不能下食，鼻中乾燥，身熱疼悶，漸覺羸瘦，寒熱不定。若喘息氣粗者難治。"若心熱勞黃，可見口乾舌澀，面目俱黃，上氣喘急等症。治宜選用柴胡散、龍膽散、秦朮散、鱉甲散等方。
72. 寒濕發黃 病證名。屬於陰黃範疇。見《證治匯補·黃病章》。指因寒濕鬱滯，脾陽虛弱，膽液外滲引起之黃疸。患者身目發黃色暗晦，神疲畏寒，食慾不振，脘腹脹悶，大便不實，小便短少，脈沉濡或濡緩，舌淡苔膩。宜溫中化濕，方如茵陳朮附湯、茵陳四逆湯、理中湯加味等。
73. 發黃 指由各種不同原因引起遍身皮膚或眼鞏膜黃雜的症狀。
74. 腎疸 病証名。九疸之一。因腎寒所致的黃疸病。主証身體面目俱黃，小便不利，不思飲食，不得臥。
- (1)《外台秘要》卷四：“腎疸，其人唇乾，葶藶子主之。”
- (2)《辨証奇聞》：“腎疸之症，身體面目俱黃，小便不利，不思飲食，不得臥，人亦以為黃疸也，誰知是腎寒之故乎。”治宜補腎中之火而佐以健脾去濕之藥，用濟水湯等方。此證腎中乾，目黃，渾身金色，小便赤澀，腎疸湯主之。(李東垣腎疸湯：治腎疸。升麻根(五錢)、蒼朮(一錢)、防風根、獨活根、白朮、柴胡根、羌活根、葛根(各五分)、白茯苓、豬苓、澤瀉、甘草根(各三分)、黃蘗(二分)、人參、神麴(各六分)。用法：分作二帖，清水煎，食前稍熱服。
75. 腎黃 病名。三十六黃之一。
- (1)《外台秘要》卷四：“腎黃，小便不通，氣急，心悶……”治宜瓜蒂散。
- (2)《太平聖惠方》卷五十五：“腎黃者，面色青黃，腰背疼痛，耳中颼颼百般聲響，腳膝無力，多唾嘔逆，不能下食，悲而不樂。若兩腳浮腫，齒黑，如大豆者難治。”治宜附子散等方。
- (3)《聖濟總錄》卷六十一：“病人腳冷，面目俱青，身上冷，臍下結，氣急衝心。”治宜用灸法或內服雞參散。
76. 脾疸 病名。
- (1)《素問》有脾疸之病名，疸與疸音義皆同。
- (2)《靈樞·經脈》：“脾足太陰之脈，是主脾所生病者，水閉，黃疸。”
- (3)《外台秘要》(《諸病源候論·黃病諸候》?)將脾疸列為九疸之一。多由飲食或嗜酒勞倦傷脾，脾胃瘀熱所引發。症見肢體發黃、溺赤而少，或兼見心慌、善恐、脅下痞脹等症，宜茵陳五苓散加減；或宜秦王散及栝蒌等藥。
- (4)《辨証奇聞》謂脾疸由寒濕困擾，脾陽不振所致。症見身黃如秋葵色，汗及涕唾有黃，小便不利，惡聞人聲。治宜健脾溫陽，佐以利水為法。
77. 脾虛發黃 病證名。脾氣虛弱導致濕熱鬱滯而致的黃疸。
- 《幼幼集成》：“蓋脾土強者，足以捍禦濕熱，必不生黃，惟其脾虛不運，所以濕熱乘之。”黃重者利濕清熱，宜茵陳五苓散；黃稍退，即速健脾。若面目俱黃而帶虛浮，宜補脾健胃，用六君子湯加減。
78. 脾黃 三十六黃之一。
- (1)《太平聖惠方》卷五十五：“脾黃者，遍身如金色，眼目俱黃，唇口生瘡，或吟或詠，有時吐逆，不能下食，大便澀，若臍凸者難治。”治宜土瓜根散等方。
- (2)《聖濟總錄》卷六十一指出脾黃患者：“病人兩頰生青脈起，目黃，

- 齒齟皆青，唇黑生瘡，通身黃色，鼻中煤生，心腹脹滿，不下飲食，大便不通，即是脾黃。"治宜豬苓湯、鹽蜜煎等方，並宜灸法。
79. 脾熱身黃 病證名。小兒黃疸，因脾胃積熱而致者，《太平聖惠方》卷八十四："夫小兒黃疸者，是熱入於脾胃，熱氣蘊積，與穀氣相搏，蒸發於外，故皮膚悉黃，眼赤黃也。"治宜清熱解毒。用茵陳丸或三黃散。
80. 脾瘴 病名。
(1)出《素問·奇病論》："有病口甘者，此五氣之溢也，名曰脾瘴。夫五味入口，藏於胃，脾爲之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也。"指過食肥甘所致，口中發甜的病證，日久遂成消渴。《內經》提出"治之以蘭，除陳氣也。"
(2)《聖濟總錄》卷四十五："內經曰，有病口甘者，此五氣之溢也，名曰脾瘴。夫食入於陰，長氣爲陽，肥甘之過，令人內熱而中滿，則陽氣盛矣，故單陽爲瘴，其證口甘，久而弗治，轉爲消渴，以熱氣上溢故也。"
(3)《張氏醫通·口》："口甘。經云，有病口甘者，此五臟之溢也，名曰脾瘴，治之以蘭，除陳氣也。蘭香飲子，若脈弦滑兼嘈雜，屬痰火，滾痰丸，此指實火而言，平人口乾欲渴，或小便甜而濁，俱屬中土溼熱，脾津上乘，久之必發癰疽，須斷厚味氣腦。服三黃湯加蘭葉、白芍、生地；燥渴甚者爲腎虛，日服加減八味丸，可保無虞。老人虛人，脾胃虛熱，不能收斂津液而口乾者，當滋補脾氣，宜補中益氣湯去升麻、柴胡、蘭香、煨葛根。
81. 虛黃 病證名。因虛發黃也，多因疸病日久或脾虛血虧，不能營養肌膚所致。
(1)《明醫指掌》卷四。指因七情不舒，勞倦太過，氣血兩虛所致的發黃。
(2)《證治匯補·黃病章》："虛黃，口淡，怔忡，耳鳴，腳軟，怠惰無力，寒熱微作，小便濁澀，皮膚雖黃而爪甲如常。"治宜益氣健脾，養血固本。方用人參養榮湯、十全大補湯等。
(3)《丹溪心法·疸病證治》謂虛黃爲黃疸之虛證，方用四君子湯、四物湯、黃耆建中湯等。
82. 陽黃 病證名。黃疸兩大類型之一。見《傷寒微旨論》。《景岳全書·雜證論》："陽黃證因濕多成熱，熱則生黃，此即所謂濕熱證也。"黃病之熱多溼少。由濕熱蘊蒸肝膽，膽熱液泄，外滲肌膚，下流膀胱而致一身面目及小便盡黃。其症狀：初起或有寒熱，身目皮膚黃色鮮明如橘子柏皮者，伴有口乾口苦、胸悶泛惡、腹脹脅痛、腹滿便秘、尿黃如濃茶、或消穀善飢，舌質紅、苔黃膩，脈弦數等症。凡風溼外感酒食內傷，皆能致之。治法以清化濕熱爲主。熱重於濕者，常用茵陳蒿湯、梔子柏皮湯、大柴胡湯等；濕重於熱者，可用茵陳五苓散等。針灸療法，瓜蒂散搐鼻、毛茛發泡療法等，對退黃及症狀都有一定療效。治宜不拘表裏，但察其元氣尙壯，脾胃無損，而溼熱果盛者，用清火邪利小便諸法，使溼熱去而黃自退，梔子柏皮湯主之。如發黃欲死，不省人事者，用白毛烏骨雞一隻，乾擗去毛，破開去腸雜，鋪心頭上，少頃即活，再用滿天星連根洗淨，約半茶鍾，搗融同豬肉數兩煮食，一二次即愈。若病後發黃，吐血成盆者，宜用田螺十箇，水漂去泥，搗爛露一宿，五更時取清汁服。多見於急性黃疸型傳雜性肝炎、鉤端螺旋體病等。有接觸傳染性。

83. 黃 三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一："@菴黃，病人身如金色、不多言語，四肢無力，好眠臥，口吐粘涎者，宜服茵陳湯方。"
84. 黃水 病名。水腫之屬於黃色者。十水之一。《中藏經·論水腫脈證生死候》："黃水者，其根起於脾，其狀先從腹腫也。" 治宜甘遂為丸，赤茯苓湯下三丸。日三服，忌鹽一月。
85. 黃如枳實 語出《素問·五藏生成篇》。是脾的真臟色。形容枯黃失澤的病色，見于久病脾氣將絕，胃氣衰敗。如肝硬化、肝癌後期等。
86. 黃汗 中醫病名，
 (1)《千金要方》以本病為五疸之一。又為五水之一。
 (2)《症因脈治》卷三："黃汗身腫之症，身熱胸滿，四肢黃腫而渴，狀如風水，汗出沾衣，色如柏汁，久不愈，必致癰膿，又有不惡風，小便利，若上焦寒，口多涎，身冷腫痛，狀如周痺，胸中窒，不能食。又有兩脛不冷，反發熱，名歷節。食已汗出，常見盜汗，汗出不涼，反發熱，久久必甲錯；生惡瘡，身@潤@潤，胸中痛，劇者不能食，身疼重，煩躁，小便不利，皆黃汗腫症也。"症見頭面四肢皆腫，脈沈遲卻發熱不惡風卻發汗而渴，汗呈黃色粘衣等三大特徵，其他伴有胸部滿悶、胸中塞、或口多涎、不能食、或腰髖弛痛，兩脛冷、骨節痛、腰痛，或久治不癒時則生癰腫或惡瘡等。發熱口渴，四肢頭面腫、小便不利等。病因是由於風、水、濕、熱交蒸所致。濕熱傷及血分時，又可並發瘡瘍。魏念庭將此謂濕成熱瘡。喜多村直寬謂濕熱瘀蓄。蓋可解作汗濕之病因。濕疹和任何化膿性皮膚病所起的黃色分泌物亦稱黃汗。皆由汗泄之時，汗出入水，壅遏榮衛或濕熱內盛與風、水相蒸溢滲所致。
 (3)《金匱水氣病脈證篇》："黃汗之為病，身體腫，發熱，汗出而渴，狀如風水，汗沾衣，色正黃如藥汁，脈自沉。"身腫而冷狀如周痺，胸中塞，不能食，反聚痛，暮躁不得眠，此為黃汗。[又]黃汗之為病，身體腫，發黃，汗出而渴，狀如風水，汗沾衣，色正黃如藥汁，脈自沈，得之汗出入水中，浴水從汗孔入得之，宜黃耆芍藥桂枝苦酒湯。[又]黃汗之病，兩脛自冷，假令發熱，此屬歷節，食已汗出，又身常暮臥，盜汗出者，此勞氣也。若汗出已反發熱者，久久其身必甲錯。發熱不止者，必生惡瘡。若身重汗出已輒輕者，久久必身@茶即胸中痛。又從腰以上必汗出，下無汗，腰髖弛痛，如有物在皮中狀，劇者不能食，身疼重，煩躁，小便不利，此為黃汗，桂枝加黃耆湯主之。按此證因脾熱汗出，用水浸浴，水入毛孔水熱壅遏，鬱於肌表營衛而成，治宜實衛和營，行陽益陰：宜耆芍桂酒湯，晝熱者加防風，夜熱者加當歸；食少者加白朮、茯苓。若挾表者，其脈必浮，宜汗之，用桂枝加黃耆湯。挾裏者，腹必脹，宜下之，用大黃硝石湯。或治以蔓菁子為末平旦以井華水服一匙，逐日漸加至兩匙，以知為度，每夜小便時，浸少許帛於內，加以記號，其黃色必漸淡，至色白則瘥，不過五升即愈。或可用味玉屏風散。
87. 黃病 病名。指有黃疸病者。即黃疸。由瘀熱宿食相搏所致身體面目皆變黃色的病證。
 (1)《太平聖惠方·黃病論》："黃病者，一身盡疼發熱，面色洞黃，七八日後壯熱，口裏有血，當下之，如豬肝狀，其人小腹滿急。若其人眼睛澀疼，鼻骨痛，兩膊及項強，腰背急，即是患黃也。黃病多大便澀，但令得小便快，即不慮死。不令大便多澀，澀即心脹不安，此由寒濕在表，

則熱蓄於脾胃，腠理不開，瘀熱與宿穀相搏，煩鬱不得消，則大小便不通，故身體面目皆變黃色。凡黃病，其寸口近掌無脈，口鼻氣冷，並不可治也。"

(2)《金匱要略·黃疸病脈證並治》："諸病黃家，但利其小便。假令脈浮，當以汗解之，宜桂枝加黃耆湯主之。"

88. 黃疸

以身黃、目黃、小便黃為主證。古代亦稱黃瘡。多由感受時邪或飲食不節，濕熱或寒濕內阻中焦，迫使膽汁不循常道所致。臨床上分為陽黃和陰黃兩大類。

(1)《素問·玉機真藏論》風者，百病之長也，今風寒客於人，使人毫毛畢直，皮膚閉而為熱。當是之時，可汗而發也，或痺不仁腫痛，當是之時，可湯熨及火灸而去之，弗治。肝傳之脾，病名曰脾風，發瘡，腹中熱，煩心，出黃。

(2)《素問·平人氣象論》："溺黃赤安臥者，黃疸。""目黃者曰黃疸。"

(3)《靈樞·經脈篇》脾足太陰之脈，是主脾所生病者，溇瀉泄水閉黃疸。[又]腎足少陰之脈，是主腎所生病者，口熱舌乾，煩心，黃疸。(又)腎足少陰之脈。是主腎所生病者。口熱。舌乾。煩心。黃疸。

(4)《靈樞·論疾診尺篇》："身痛而色微黃，齒垢黃，爪甲上黃，黃疸也。"

(5)《素問平人氣象論》目黃，黃赤，安臥者，黃疸。

(6)《傷寒論》和《金匱要略》認為其發病多由瘀熱與濕相搏，不得泄越所致;也有因寒濕在裏不解所引致。本病有陰黃陽黃，在臟在腑之分。陽黃者因濕熱內蘊，熱多濕少，熏蒸郁遏，身目俱黃如橘子色，身熱而煩渴者，病屬陽黃。陰黃為寒濕內結，濕多熱少，浸淫肌膚，色黃如煙熏，病屬陰黃。《金匱·黃疸病脈證篇》：寸口脈浮而緩，浮則為風，緩則為痺，痺非中風，四肢苦煩，脾色必黃，瘀熱以行。[又]脈沈，渴欲飲水，小便不利者，皆發黃。[又]腹滿，身痿黃，躁不得睡，屬黃家。[又]病黃疸，發熱煩喘，胸滿口燥者，以病發時火劫其汗，兩熱相得，然黃家所得，從溼得之。一身盡發熱而黃，肚熱，熱在裏，當下之。[又]疸而渴者，其疸難治。疸而不渴者，其疸可治。發於陰部，其人必嘔;發於陽部，其人振寒而發熱也。[又]諸黃家病，但利其小便。假令脈浮者，當以汗解之，宜桂枝加黃耆湯。[又]黃疸，腹滿，小便不利而赤，自汗出，此為表和裏實，當下之，宜大黃硝石湯。[又]黃疸病，茵陳五苓散主之。[又]黃疸病，小便色不變，欲自利，腹滿而喘，不可除熱，熱除必噦，噦者，小半夏湯主之。[又]諸黃，腹滿而嘔者，宜柴胡湯。[又]諸黃，豬膏髮煎主之。[又]男子黃，小便自利，當與虛勞小建中湯。[又]黃疸之病，當以十八日為期，治

(7)《臨證指南醫案·疸》："黃疸，身黃目黃溺黃之謂也，病以濕得之，有陰有陽，在腑在臟。陽黃之作，濕從火化，瘀熱在裏，膽熱液泄…熏蒸遏鬱，侵於肺則身目俱黃，熱流膀胱，溺色為之變赤，黃如橘子色，陽主明，治在胃。陰黃之作，濕從寒水，脾陽不能化熱，膽液為濕所阻，瀆於脾，浸淫肌肉，溢於皮膚，色如熏黃，陰主晦，治在脾。"

89. 黃疸二十八候

古代對黃病的一種分類法。見《諸病源候論·黃病諸候》。即黃病候、急黃候、黃汗候、犯黃候、勞黃候、腦黃候、陰黃候、內黃候、行黃候、癖黃候、噤黃候、五色黃候、風黃候、因黃發血候、因黃發痢候、因黃

發痔候、因黃發癰候、因黃發病後小便澀兼石淋候、因黃發吐候、黃疸候、酒疸候、穀疸候、女勞疸候、黑疸候、九疸候、胞疸候、風黃疸候、濕疸候等二十八種黃病症候。其中因黃發血候、因黃發痢候、因黃發痔候、因黃發癰候、因黃發病後小便澀兼石淋候、因黃發吐候係黃疸併發症。

90. 黃瘰

即"黃疸"。《素問·六元正紀大論》"民病寒熱，噎乾黃瘰，飢衄飲發。"

91. 黑疸

病名。五疸之一。症見身黃不澤、目青、面額色黑、膚燥、搔之不覺、大便黑、膀胱急、足下熱，脈浮弱;甚則腹脹，如有水狀，面浮，脊痛不能正立等。肌膚消燦，周身泛黑，中醫病名為黑疸。

(1)出《金匱要略·黃疸病脈証并治》。此証由黃疸變黑，或因女勞疸誤服攻下藥，牽延失治發展而成。為土敗水溼之象，初起形神未槁。猶可施治。若病久肌膚消燦。真元告匱。則難回榮於竭澤矣。是為險惡之候，遷延不治，肝腎虛衰，瘀濁內阻，十中難救一二。

(2)《諸病源候論》卷十二：“黑疸之狀，苦小腹滿，身體盡黃，額上反黑，足下熱，大便黑。是夫黃疸、酒疸、女勞疸，久久多變為黑疸。”或兼見心中懊懣，腹脹面浮等症。治宜扶正攻邪。以補肝腎為主，攻邪化瘀濁為輔。治法如下:額黑足熱，膀胱急，小便利，甚至周身漸黑，大便亦黑，腹脹如水者，此由女勞而腎氣發也，宜黑疸湯。酒疸下後，目青面黑，微帶黃色，心中如噉蒜狀，大便亦黑，皮膚不仁，脈浮弱者，此因腎氣上乘，邪盛正虛，宜急用硝石礬石散，晨夕進數丸以下之。俟瘀血盡後，再用桂苓歸芍之屬以調理之，土瓜根、搗汁一升，燉服之，病當從小便出。沈氏尊生書方:治黑疸，茵陳蒿(四兩，搗取汁一合)、瓜萋根(一斤，搗取汁六合);沖和燉服之，必有黃水自小便中下，如不下，再服。本病可見于多種阻塞性黃疸疾病晚期。

92. 黑黃

三十六黃之一。《太平聖惠方》卷五十五:"黑黃者，面色或黃或黑，眼目青色，腰脊拘急，口中兩頰，有黑脈出口角者難治。"用鬼白汁方或灸烙法。

93. 傷寒陰黃

《傷寒論》身寒發汗已，身目為黃。所以然者，以寒溼在裏不解故也，不可下，於寒溼中求之。按此證因脾弱溼重所致，多見肢體逆冷，嘔悶自利，胸中氣促，舌上胎滑，脈沈細而緊。治法如下:小便不利，煩躁而渴者，宜茵陳湯加茯苓、豬苓、滑石、當歸、官桂。-煩躁喘嘔不渴者，宜茵陳湯加陳皮白朮、生薑、半夏、茯苓。四肢躄身冷者，宜茵陳湯加附子、甘草。-肢體逆冷腰上自汗者。宜茵陳湯加附子、乾薑甘草。°冷汗不止者。宜茵陳湯加附子、乾薑。(以上各藥皆宜次第用之。有食者加枳、白朮、橘皮、半夏、草豆蔻。)±服以前諸藥不應。脈尚遲者，宜茵陳湯加吳茱萸、附子、乾薑、木通、當歸。若見寸口近掌無脈，口鼻氣冷者死。

94. 傷寒發黃

病證名。指外感病邪而出現黃疸症者。

(1)《傷寒論》:傷寒脈浮而緩，手足自溫繫在太陰，太陰當發身黃。若小便自利者，不能發黃，以脾家實，腐穢當去故也。[又]太陽病，中風，以火劫發汗，邪風被火熱，血氣流溢，失其常度，兩陽相熏灼，其身發黃。[又]太陽病，身黃，脈沉結，少腹滿，小便不利者，為無血也。[又]

陽明病，被火額上微汗出，小便不利者，必發黃。[又]陽明病，面合赤色，不可攻之，必發熱色黃，小便不利也。[又]陽明中風，脈弦浮大而短氣，腹部滿，脅下及心痛，久按之，氣不通，鼻乾，不得汗，嗜臥，一身及面目悉黃，小便難，有潮熱，時時噦，耳前後腫，刺之小差。外不解病過十日脈續浮者，與小柴胡湯。脈但浮無餘證者，與麻黃湯。若腹滿加噦者，不治。

(2)《景岳全書·雜證論》：“表邪發黃，即傷寒證也。凡傷寒汗不能透而風濕在表有黃證，或表邪不解，自表傳裏而濕熱鬱于陽明者，亦有黃證。表邪未解者，必發熱，身痛，脈浮，少汗，宜從汗散；濕熱內鬱者，必煩熱，脈緩滑，多汗，宜從分消清利；若陽明實邪內鬱而痞結脹滿者，宜先下之，然後清其餘熱。”又：“傷寒發黃，凡表邪未清而濕熱又盛者，其證必表裏兼見，治宜雙解，以柴苓湯或茵陳五苓散主之；若內熱甚而表邪仍在者，宜柴苓煎主之；若但有濕熱內實脹滿等證而外無表邪者，宜茵陳蒿湯主之；若因內傷勞倦致染傷寒者，亦多有發黃之證，但察其本無濕熱實邪等證，即當以陰黃之法調補治之。”

(3)《備急千金要方》卷十：指黃汗、黃疸、穀疸、酒疸、女勞疸等五種黃疸為傷寒發黃。

95. 溼疸

病証名。黃疸二十八候之一。

(1)見《諸病源候論·黃病諸候》即溼重于熱之黃疸，一名溼黃。

(2)《萬病回春》卷二，“溼疸病者，脾胃有熱，與溼氣相搏，故病苦身體疼，面目黃，小便不利，此為溼疸。”或謂溼疸之黃，色偏于晦，可有發熱、肢體沉重，不欲飲水等症。治以化溼利水、消黃法。選用茵陳五苓散、茯苓滲溼湯等方。溼疸壯熱，少腹痞滿、疼痛，內有瘀血，當用下血法，宜少腹逐瘀湯加減。參見黃疸諸條。溼疸，四肢沉重，似渴不欲飲，用大茵陳湯；內有實熱，宜用茵陳梔子黃連三物湯；無實熱，用小建中湯；兼有往來寒熱者，用小柴胡加梔子湯；腹痛而嘔，用小柴胡湯。溼邪在表，并可兼用發汗法。常用方為麻黃連翹赤小豆湯、茵陳五苓散等方。參見黃疸、溼黃等條。

96. 溼黃

黃疸之因溼勝而色晦黯者。此證四肢沈重，小便不利，渴不欲飲。宜大茵陳湯。

97. 瘀血發黃

病證名。

(1)見《醫學入門》卷五。又名瘀血黃、蓄血發黃，指身黃因於瘀血所致。

(2)《證治匯補》卷三：“瘀血發黃，喜忘如狂，溺清，便黑。”《張氏醫通·雜門》：“有瘀血發黃，大便必黑，腹脅有塊或脹，脈沉或弦，大便不利，脈稍實而不甚弱者，桃核承氣湯。下盡黑物則退。”

(3)《明醫指掌》卷四：“瘀血黃者，大便黑，小便利，抵當湯、桃仁承氣湯，量人虛實，下盡黑物則愈。”

98. 痿黃

病證名。出《金匱要略·黃疸病脈證並治》。義同萎黃。指身黃而色偏於晦暗，而目無黃疸之色。

99. 經閉黃疸

病證名。指婦女經閉又患黃疸。

丁甘仁《女科醫案》：“室女經閉，肝失疏泄，宿瘀內阻，水穀之濕逗留，太陰、陽明、厥陰三經為病，始而少腹作痛，繼則腕脹納少，目黃、溲赤，肌膚亦黃，大便色黑，現為黃疸。久則恐成血臟，急宜健脾逐濕，

祛瘀通經。方用蒼朮、大腹皮、蘇木、陳皮、厚朴、桃仁、延胡索、赤茯苓、茵陳、紅花、澤瀉，青鱗丸吞服。"

100. 腦黃 病名。黃疸二十八候之一。《諸病源候論·黃病諸候》："熱邪在骨髓，而腦為髓海，故熱氣從骨髓流入於腦，則身體發黃，頭腦痛，眉疼，名為腦黃候。"治宜石膏散等方。
101. 厭黃 病證名。三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一：其證四肢煩疼，手足無力，吐逆，不下飲食，漸漸瘦弱。治用灸烙法；內服大黃湯等方。
102. 膏疸 病名。九疸之一。見《諸病源候論·黃病諸候》。《外臺秘要》卷四，以肺癰為膏疸，症見身面皆黃，飲少而小便多。多因飲食過度，醉酒勞傷，脾胃有瘀熱所致。多兼有飲少而小便量多、色黃。治宜秦椒散等方，亦可用茵陳五苓散加減。
103. 蓄血發黃 病證名。多因瘀熱內蓄，膽汁外溢所致。《傷寒全生集·辨傷寒發黃》："蓄血發黃者，其人身黃，脈沉結，小腹滿硬，小便自利，大便黑色，其人如狂，此為蓄血在下焦，用桃仁承氣湯下之，蓋血下則黃退也。"
104. 瘟疫發黃 此證因淫熱熏蒸。溼濁壅遏所致。宜於清瘟敗毒散中重用石膏、梔子。加茵陳、滑石、豬苓、澤瀉、木通。然亦有宜下者。須細審之。
105. 瘟黃 病名。疫病發黃之簡稱。指觸感疫癘之氣所致的黃疸，泛指伴有黃疸的烈性傳染病。明·王綸《明醫雜著》卷二曰："若時氣發熱，變為黃病，所謂瘟黃也。"清·沈金鰲《雜病源流犀燭·諸疸源流》曰："有天行疫癘以致發黃者，俗謂之瘟黃，殺人最急。"瘟黃症見高熱神昏，身目呈渾黃色，小便赤如濃茶，腹脹，脅痛，甚至吐衄，便血或發斑，舌紅絳，苔黃燥，脈弦洪數。治宜清熱化濕，涼營解毒、芳香開竅等法，如茵陳蒿湯合清瘟敗毒飲、甘露消毒丹、紫雪丹或安宮牛黃丸、神犀丹等。危重者，急宜中西醫結合搶救。《雜病廣要·黃疸》稱本病為急黃。類於急性黃疸型傳染性肝炎，黃疸型鉤端螺旋體病等。
106. 穀疸 病名。五疸之一。因飢飽失宜，濕熱薰蒸，食滯阻遏中焦所致黃疸症。此証寒熱不食，食則頭眩，胃脘不適，日久發為黃疸，多因飢飽不均而得。
- (1)《金匱黃疸病脈證篇》跌陽脈緊而數，數則為熱，熱則消穀。緊則為寒，食即為滿，尺脈浮為傷腎，跌陽脈緊為傷脾，食穀即眩，穀氣不消，胃中苦濁，濁氣下流，小便不通。陰被其寒，熱流膀胱，身體盡黃，名曰穀疸。(又)陽明病脈遲者，食難用飽，飽則發煩頭眩，小便必難，此欲作穀疸。雖下之，腹滿如故。所以然者，脈遲故也。(又)穀疸之為病，寒熱不食，食即頭眩，心胸不安，久久發黃，為穀疸，茵陳蒿湯主之。按此證始於風寒而成之於飲食，多見食畢頭眩，心中佛鬱不安，遍身發黃，治宜小柴胡湯去參加白朮、炮薑、膽草、枳實。二便秘者，用茵陳蒿湯。虛者用胃疸湯。餘如穀疸丸、寶鑑茵陳梔子湯、紅丸子、膽礬丸之屬，均可酌用。《聖濟總錄》卷六十："失饑飽甚，則胃中滿塞，穀氣未化，濕氣薰蒸，遂為穀疸。其證心下懊悶，頭眩心鬆，佛鬱發煩，小便不利，身黃如橘是也。"治宜清熱化濕，用茵陳蒿湯、穀膽丸、加味枳朮湯等方。
- (2)又名胃疸、胃黃。見《雜病源流犀燭·諸疸源流》。
107. 蝦蟆黃 病名。三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一："治蝦蟆黃，舌上青脈起，七日盛，九日病過，急烙大椎即效。此病晝夜不睡，宜服豉梔湯方。"

108. 豬黃 病名。黃病而見口嚼沫從口角出者。三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一：“治豬黃口嚼沫從口角出，九日可治，十日疾勢已過。宜急灸兩牙關二十七壯，次灸承漿二十七壯。”
109. 鴉黃 病名。三十六黃之一。《太平聖惠方》卷五十五：“鴉黃者，十指青綠，舌上生黑點，唇口青黑，身如黃銅。”宜用治膽黃方及點烙法。
110. 噤黃 黃病二十八候之一。《諸病源候論·黃病諸候》：“心脾二藏有瘀熱所為。心主於舌，脾之絡脈，出於舌下，若身面發黃，舌下大脈起青黑色，舌噤強不能語，名為噤黃也。”
111. 濕疸 黃疸二十八候之一。
 (1) 見《諸病源候論·黃病諸候》，指黃疸之濕重于熱者，其症色黃而晦，一身盡疼，四肢沉重，不欲飲水，小便不利，發熱等。治宜化濕利水，如茵陳五苓散、除濕丹之類。
 (2) 如濕疸七八日後壯熱，熱在裏，有血當下，其少腹滿者，急下之(見《千金要方·傷寒發黃》論濕疸)。
112. 濕黃 病名。
 (1) 見《證治准繩·雜病》。指黃疸之濕邪偏重者。
 (2) 《醫學入門》卷五：“濕黃濕勝，色黃而晦，大便潤利。又濕病與黃病相似，但濕病在表，一身盡痛，黃病在裏，一身不痛。”如證見小便不利，四肢沉重，似渴不欲飲者，大茵陳湯；大便自利而黃，有實熱者，茵陳梔子黃連三物湯；無實熱者，小建中湯；往來寒熱，一身盡黃者，小柴胡加梔子湯；腹痛而嘔者，小柴胡湯。濕黃併可用發汗，利小便等法，麻黃連翹赤小豆湯、茵陳五苓散等方均可選用。參見黃疸、溼疸等條。
113. 濕熱發黃 病證名。屬黃疸病之陽黃範疇。指因濕熱蘊結脾胃，熏蒸肝膽所致的黃疸，症見身熱、煩渴、脘腹脹滿或躁擾不寧、小便熱痛赤澀或大便秘結、脈洪滑有力等。
 (1) 見《丹溪心法·疸》。為濕熱相搏所致之黃疸。
 (2) 《傷寒全生集·辨傷寒發黃》：“濕熱發黃，一身盡痛，發熱口渴，小便不利，色如熏黃，暗而不明也。”如熱重於濕，則色如橘黃鮮明，口渴較甚，治以清熱為主、兼用利濕，用茵陳蒿湯、大黃硝石湯等。如濕重於熱，兼見頭重身倦，胸脘痞滿，治以利濕為主、佐以清熱，方用茵陳五苓散、參苓滲濕湯、甘露消毒丹等。
114. 膽黃 病名。三十六黃之一。因大驚大恐或鬥毆受傷，膽氣傷敗液泄所致的病證。證見身目呈黃綠色、胸中氣滿、不思飲食、昏沉困倦。
 (1) 《聖濟總錄》卷六十一：“病人體上黃綠色，胸中氣滿，或硬，不下飲食，此是膽黃。”治用黃芩湯。-驚恐膽虛而致的黃疸。
 (2) 《太平聖惠方》卷五十五：“膽黃者，面色青黃，多驚少臥，悲泣不定，嗔怒無恆，舌上生瘡，唇口乾燥，若喘粗不止者，難治。
 (3) 《景岳全書·雜證論》：“膽黃證，凡大驚大恐及斗毆傷者皆有之。”其證則無火無濕，其人則昏沉困倦，其色則正黃如雜。凡此數證，皆因傷膽。蓋膽傷則膽氣敗而膽液泄，故為此證。”治宜選用甘溫、酸澀、重鎮等藥，亦可用車前子散等方。
115. 瘴 (1) “疸”；又讀“旦”，通“疸”。黃疸病。《素問·玉機真臟論》：“肝傳之脾病名曰脾風，發瘴，腹中熱，煩心，出黃。”

(2)讀"單"，熱症。《素問·脈要精微論》：“痺成爲消中。”《素問·舉痛論》：“痺熱焦渴。”《素問·奇痺論》：“此五氣之溢也，名曰脾痺。《史記·扁鵲倉公列傳》：“風痺客@躄，難于大小溲，溺赤。”³ 勞病《說文》。

116. 癩黃 病名。三十六黃之一。指陰盛之黃疸。
(1)《外台秘要》卷四：“病源陽氣伏，陰氣盛，熱毒加之，故但身面色黃，頭痛而不發熱，名爲癩黃也。
(2)《廣濟》療癩黃，身面眼俱黃，小便如豉汁色，茵陳散方。”
(3)《聖濟總錄》卷六十一：“癩黃，病人身如金色，不多言語。四肢無力，好眠臥，口吐粘涎者，宜服茵陳湯方。”
117. 癰黃 病名。
(1)黃病二十八候之一。《諸病源候論·黃病諸候》：“氣水飲停滯結聚成癰，因熱氣相搏，則鬱蒸不散，故脅下滿痛，而身發黃，名爲癰黃。”
(2)三十六黃之一。《太平聖惠方》卷五十五治癰黃用半夏散方。
118. 犢黃 三十六黃之一。《聖濟總錄》卷六十一：“治犢黃，舌兩邊先從後起，次生向前，兩傍有赤脈，狀如蚯蚓。宜急烙斷，毒氣貫舌，其狀紫色；次灸兩口角，及人中並承漿。”
119. 驚黃 病名。三十六黃之一。黃疸病兼見驚悸者。
《太平聖惠方》卷五十五：“驚黃者，面色青黃，心多驚悸，口舌乾燥，不肯眠臥，臥即多言語狂亂，身體壯熱。”治用點烙法，內服犀黃散或牡荊湯等方。
120. 髓疸 病名。九疸之一。此證目眦嗜臥。《外臺秘要》卷四：“髓疸，目眶深，多嗜臥，牡蠣、澤瀉主之。”
121. 髓黃 病名。三十六黃之一。
(1)《太平聖惠方》卷五五：“髓黃者，身體赤黃，四肢不舉，肌肉戰掉，鼻中出血，兩腳疼悶，一手專安額上，身不壯熱，愛冷處臥。”治療外用點烙法，內服地骨皮散。
(2)《聖濟總錄》卷六一：“髓黃，病人四肢疼痛無力，好眠冷地，身體遍黃，次便青綠色起，唇齒俱白，眼帶微腫。”治宜用黃耆散等方並施灸法。
122. 鬱黃 氣鬱而發黃也。此證忌用茵陳、五苓之屬。宜逍遙散。